



William Clay Albrecht, MD · Charles J. Aramburo, MD · Joey M. Bluhm, MD · Kelly S. Dempsey, MD · Elegy Etter, MD · Buckminster J. Farrow, MD · John D. Fisher, MD · Adrienne Floyd, MD · Amanda Garza · Robert M. Hillery, MD · Eddie Lambert, MD · Anne Le, MD · Liz Lee, MD · Thomas Wylie Moore, MD · Rick Ngo, MD · Guillermo Ponce de Leon, MD · Arlene Ricardo, MD · Murtaza Shakir, MD · Robert Shirley, MD · Lucrecia Sta Ana, MD · Michael Todd Wood, MD

Instrucciones postoperatorias para la Apendectomía Laparoscópica e Abierta

Llame y haga su visita postoperatoria para que se realice aproximadamente de 7-10 días después de la cirugía.

Cuidado de heridas:

- 1) Retire el vendaje externo (si lo tiene) a las 24-48 horas después de la cirugía
- 2) Deje los “steri-strips” en su lugar, si los tiene. Se caerán por su propia cuenta.
- 3) Usted puede que tenga pegamento de piel sellando su incisión; esto asemeja al pegamento de “super glue” y se usa para reforzar sus suturas solubles haciendo que su incisión sea resistente al agua y permitiéndole darse una ducha. No se remoje en una bañera o vaya a nadar durante 14 días.
- 4) Durante las primeras 24 horas puede usar una bolsa de hielo para reducir la inflamación en la zona de cirugía y luego cambiar al calor si es necesario. Es normal sentir un nudo debajo la incisión quirúrgica durante varios meses después de la cirugía.
- 5) Puede darse una ducha 24 horas después de la cirugía. Seque la incisión quirúrgica después de bañarse y cubra con gasa seca si es necesario.
- 6) Los antibióticos deben tomarse según lo prescrito hasta completar la dosis.

Dieta:

Después de la cirugía puede avanzar su dieta de acuerdo a tolerancia. Si experimenta náuseas y vómitos después de la cirugía, comience con una dieta líquida clara y llame a la oficina.

Actividad:

Durante 6 semanas después de la cirugía

- 1) No cargar nada de más de 20 libras.
- 2) No ejercicios extenuantes como flexiones, abdominales o tensión abdominal
- 3) Se alienta caminar.
- 4) Se alienta actividades diarias normales.
- 5) Correr y andar en bicicleta se permiten cuando se sienta que puede hacerlo.
- 6) No conducir hasta que no tenga dolor y ya no use su medicamento para el dolor.
- 7) Evitar el reposo en cama prolongado.

Estreñimiento e Hinchazón:

- 1) Debe tener un movimiento intestinal dentro de 3 días de la cirugía. Si tiene estreñimiento, aumente la toma de agua y utilice un “over-the-counter” (sin receta) ablandador de heces así como el aceite mineral o un laxante así como la leche de magnesia según lo dirigido en la botella. Medicamentos para el dolor a menudo causan estreñimiento.
- 2) Si se siente hinchado(a) aumente su actividad.

| | |
|--|--|
| Memorial Hermann Sugar Land Location: | 17510 W. Grand Parkway S., Suite 490 · Sugar Land, Texas 77479 |
| Methodist Sugar Land Location: | 16651 Southwest Freeway, Suite 360 · Sugar Land, Texas 77479 |
| Memorial Hermann Southwest Location: | 7777 Southwest Freeway, Suite 810 · Houston, Texas 77074 |
| Memorial Hermann Katy Location: | 23920 Katy Freeway, Suite 410 · Katy, Texas 77494 |
| Memorial Hermann Memorial City Location: | 920 Frostwood, Suite 620 · Houston, Texas 77024 |
| Memorial Hermann Cypress: | 27700 Northwest Freeway, Suite 330 · Cypress, Texas 77433 |
| St. Joseph Hospital | 1315 St. Joseph Pkwy Suite 1708 · Houston, TX 77002 |
| Pearland Kirby Medical Plaza Location: | 10970 Shadow Creek Parkway, Suite 220 · Pearland, Texas 77584 |
| Woman’s Hospital: | 7400 Fannin Dr., Suite 850 · Houston, Texas 77054 |
| Central Business Office: | 13811 Murphy Road · Stafford, Texas 77477 |



William Clay Albrecht, MD · Charles J. Aramburo, MD · Joey M. Bluhm, MD · Kelly S. Dempsey, MD · Elegy Etter, MD · Buckminster J. Farrow, MD · John D. Fisher, MD · Adrienne Floyd, MD · Amanda Garza · Robert M. Hillery, MD · Eddie Lambert, MD · Anne Le, MD · Liz Lee, MD · Thomas Wylie Moore, MD · Rick Ngo, MD · Guillermo Ponce de Leon, MD · Arlene Ricardo, MD · Murtaza Shakir, MD · Robert Shirley, MD · Lucrecia Sta Ana, MD · Michael Todd Wood, MD

Llame a nuestra oficina si:

- 1) Se le presentan signos o síntomas inusuales, como sensibilidad, sangramiento, enrojecimiento o secreción en la zona de la cirugía.
- 2) Tiene una temperatura de 100.5 grados o más.

- 3) Tiene falta de aliento ante un esfuerzo.
- 4) Usted no puede orinar en un plazo de 8 horas después de la cirugía.
- 5) Su dolor no se controla con su medicamento para el dolor.

Drenajes:

A veces se utilizan drenajes después de la cirugía para promover la curación, se le darán instrucciones sobre cómo vaciar y documentar los totales de 24 horas en cada drenaje (por lo general uno y en ocasiones dos drenajes se colocan). Este registro del total drenado se debe traer a su visita posoperatoria para que su médico lo revise y es a menudo uno de los factores decisivos con respecto a la extracción del drenaje.

Fumar:

Fumar puede causar una multitud de problemas para un paciente quirúrgico, incluyendo la no curación de una incisión quirúrgica y aumentar las posibilidades de infección postoperatoria. No fume durante dos semanas antes y dos semanas después de la cirugía.

“Refill” (repetición) de medicamentos:

Por favor llame a su farmacia y solicite directamente cualquier “refill” necesario. La farmacia se pondrá en contacto con nuestra oficina y los “refills” serán acelerados.

| | |
|--|--|
| Memorial Hermann Sugar Land Location: | 17510 W. Grand Parkway S., Suite 490 · Sugar Land, Texas 77479 |
| Methodist Sugar Land Location: | 16651 Southwest Freeway, Suite 360 · Sugar Land, Texas 77479 |
| Memorial Hermann Southwest Location: | 7777 Southwest Freeway, Suite 810 · Houston, Texas 77074 |
| Memorial Hermann Katy Location: | 23920 Katy Freeway, Suite 410 · Katy, Texas 77494 |
| Memorial Hermann Memorial City Location: | 920 Frostwood, Suite 620 · Houston, Texas 77024 |
| Memorial Hermann Cypress: | 27700 Northwest Freeway, Suite 330 · Cypress, Texas 77433 |
| St. Joseph Hospital | 1315 St. Joseph Pkwy Suite 1708 · Houston, TX 77002 |
| Pearland Kirby Medical Plaza Location: | 10970 Shadow Creek Parkway, Suite 220 · Pearland, Texas 77584 |
| Woman’s Hospital: | 7400 Fannin Dr., Suite 850 · Houston, Texas 77054 |
| Central Business Office: | 13811 Murphy Road · Stafford, Texas 77477 |